

Campagne régionale de prévention des ITSS en Outaouais



aime-toi.ca

QUIZ SUR LE CONDOM ET LES ITSS

Vrai ou Faux?	V	F
1. Je dois utiliser un condom même pour le sexe oral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. On peut attraper une ITSS lors de la première relation sexuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Je mets toujours un condom lors des relations sexuelles, je n'ai donc pas besoin de me faire dépister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Une personne peut avoir une ITSS sans le savoir (sans symptômes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. La chlamydia et la gonorrhée peuvent guérir sans traitement si on attend assez longtemps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. La chlamydia et la gonorrhée peuvent causer des douleurs au bas-ventre ou provoquer l'infertilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Lorsqu'on a de nombreux partenaires sexuels, on a plus de risque d'attraper des ITSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Si on a confiance en son chum ou sa blonde, on peut arrêter d'utiliser le condom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Les contraceptifs oraux (la pilule) protègent aussi contre certaines ITSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Les vaccins reçus à l'école (en 4e primaire et 3e secondaire) protègent aussi contre certaines ITSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Si j'ai 14 ans, mes parents doivent m'accompagner si je veux passer un test de dépistage ou obtenir une contraception	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RÉPONSES AU QUIZ

Vrai ou Faux?	V	F
<p>1. Je dois utiliser un condom même pour le sexe oral</p> <p><i>Les ITSS ne se transmettent pas uniquement lors de relations sexuelles avec pénétration vaginale ou anale. Elles peuvent aussi se transmettre lors du sexe oral (ex. gonorrhée, herpès).</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>2. On peut attraper une ITSS lors de la première relation sexuelle</p> <p><i>Tu peux attraper une ITSS dès la première relation sexuelle. Avant la première relation sexuelle, il est important que tu consultes un médecin ou une infirmière qui te parlera de la protection contre les ITSS et les grossesses. Dans tous les cas, ne prends pas de risque : utilise un condom, même la première fois.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3. Je mets toujours un condom lors des relations sexuelles, je n'ai donc pas besoin de me faire dépister</p> <p><i>Le condom offre une bonne protection mais même avec le condom, il est possible d'attraper une ITSS (si le condom est mal utilisé, mis trop tard ou périmé par exemple). Le dépistage est donc recommandé dès que tu as des relations sexuelles.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>4. Une personne peut avoir une ITSS sans le savoir (sans symptômes)</p> <p><i>Très souvent on n'a aucun symptôme, mais on peut quand même transmettre l'infection à son/sa partenaire ou avoir des complications de la maladie. C'est pour cette raison qu'il est important de porter un condom, se faire dépister et traiter rapidement.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. La chlamydia et la gonorrhée peuvent guérir sans traitement si on attend assez longtemps</p> <p><i>Tu dois recevoir un traitement si tu as une ITSS, parce que si une ITSS n'est pas traitée rapidement, elle peut causer complications. Tes partenaires doivent aussi être traités, en même temps que toi.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>6. La chlamydia et la gonorrhée peuvent causer des douleurs au bas-ventre ou provoquer l'infertilité</p> <p><i>La chlamydia et la gonorrhée ainsi que les autres ITSS peuvent entraîner des complications sérieuses si elles ne sont pas traitées : douleurs au bas-ventre, infertilité ou même des cancers.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. Lorsqu'on a de nombreux partenaires sexuels, on a plus de risque d'attraper des ITSS</p> <p><i>Plus tu as eu de partenaires sexuels, plus tu as de risques de contracter une ITSS. Ce risque augmente davantage si tes partenaires ont eux aussi plusieurs partenaires sexuels. Si toi ou ton/ta partenaire avez eu plus de trois partenaires sexuels au cours de la dernière année, vous êtes davantage à risque d'attraper une ITSS.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>8. Si on a confiance en son chum ou sa blonde, on peut arrêter d'utiliser le condom</p> <p><i>La confiance ne suffit pas. Plusieurs ITSS ne présentent pas de symptômes. Il se peut que la personne elle-même ne sache pas qu'elle est infectée par une ITSS. Alors, même si tu connais bien ton/ta partenaire, ne prends pas de risque : utilise toujours un condom. Si toi ou ton/ta partenaire voulez arrêter d'utiliser le condom, vous devez d'abord consulter un professionnel de la santé.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>9. Les contraceptifs oraux (la pilule) protègent aussi contre certaines ITSS</p> <p><i>La pilule permet d'éviter des grossesses, mais ne protège pas des ITSS. Utiliser à la fois le condom et un moyen de contraception efficace est très important, car on se protège contre les ITSS et on évite une grossesse non planifiée!</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>10. Les vaccins reçus à l'école (en 4e primaire et 3e secondaire) protègent contre toutes les ITSS</p> <p><i>Les vaccins reçus à l'école ne protègent pas contre toutes les ITSS, mais uniquement contre certains virus du papillome humain (VPH) et l'hépatite B. Il n'existe pas de vaccin contre la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l'hépatite C, le VIH et l'herpès. Si tu penses ne pas avoir reçu tous les vaccins recommandés, consulte un médecin ou une infirmière (CLSC ou à ton école).</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>11. Si j'ai 14 ans, mes parents doivent m'accompagner si je veux passer un test de dépistage ou obtenir une contraception</p> <p><i>Si tu as 14 ans et plus, tu n'as pas besoin d'être accompagné(e) par tes parents. De plus, tout ce que tu diras au médecin ou à l'infirmière restera confidentiel. Si tu as moins de 14 ans, il faut l'accord de tes parents.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C'est la fin du quiz!

N'oublie pas... Pour avoir à nouveau toutes les informations sur la sexualité et la prévention, les lieux où obtenir des condoms et les lieux où tu peux te faire dépister pour les ITSS en Outaouais : aime-toi.ca